Van: [redacted]
Verzonden: 26-10-2023 18:27
Aan: info@nvwa.nl
Onderwerp: FW: Vraag gebruik gewasbeschermingsmiddelen - A. Verschoor Horticulture Import-Export B.V. - Marcelisvaartpad 17 te Haarlem

---

Geachte heer, mevrouw,

Zoals vanmiddag telefonisch met uw collega besproken hebben wij onderstaand verzoek binnengekregen. Besproken is om de melding naar jullie instantie door te sturen en zodat de melding door jullie verder wordt opgepakt.

De melder, [redacted] heb ik hier vanmiddag telefonisch van op de hoogte gebracht. De melder gaf aan dat hij al eerder contact met de NVWA heeft gehad en tegen hem had gezegd dat ze hem toen niet verder kon helpen.

De melder verwijst naar de Wet gewasbeschermingsmiddelen en dat een ondernemer een logboek moet bijhouden wanneer en welk gewasbeschermingsmiddel is gebruikt. Ik ga ervan uit dat de melder doelt op artikel 26 van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7.3a van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Aangegeven dat wij als Omgevingsdienst IJmond voor voornoemde wetgeving niet het bevoegd gezag zijn en wij om die reden de melding hebben doorgegeven aan de NVWA.

In de mail van de melder wordt verder aangegeven dat wij op 7 juli 2022 een bezoek hebben gebracht aan het bedrijf. In het verslag van dit bezoek door een collega toezichthouder wordt aangegeven dat er op 17 juni 2022 meststoffen zijn gebruikt die een zeer sterke en typische geur afgeven. Het middel dat toen is gebruikt heet Optysil, een minerale meststof met biostimulerende eigenschappen (zie bijlage foto van het product).

Pakken jullie de kwestie verder op? Indien er nog vragen zijn en of wij nog iets kunnen betekenen dan hoor ik dat graag. Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Medewerker Omgevingsrecht

odijmond
OMGEVINGSDIENST IJMOND

Stationsplein 48 b

INTERMAG

OPTYSIL®

MINERALE MESTSTOF MET
BIOSTIMULERENDE EIGENSCHAPPEN

EG-meststof
(E1.4c.) IJzermeststof in oplossing 2% (EDTA) voor oplossing

HET GEHALTE VAN DE INGREDIËNTEN UITGEDRUKT IN:	% (m/m)	g/l
ijzer (Fe) chelaatvormer EDTA	2,0	24,0
Alle voedingsstoffen zijn volledig in water – oplosbaar.		

Gebruiksdoel: OPTYSIL® is een vloeibare meststof met stimulerende eigenschappen. OPTYSIL® bevat 16,5% SiO_2 (7,8% Si). Het activeert het natuurlijke immuunsysteem van planten en stimuleert indirect hun groei en ontwikkeling, inclusief de ontwikkeling van het wortelstelsel. OPTYSIL® wordt gekenmerkt door een neutrale pH, wat ervoor zorgt dat het te combineren is met de meeste eelgebruikte gewasbeschermingsmiddelen. Het is vooral belangrijk om OPTYSIL® preventief aan te brengen - voordat er zich stresssituaties voordoen.

Toepassingswijze: Gebruik OPTYSIL® als een waterige oplossing voor bladtoepassing, bemesting en bewatering. Gebruik met andere gewasbeschermingsmiddelen als de mengbaarheid positief is getest. De concentratie en de hoeveelheid van de oplossing kunnen worden aangepast aan de toegepaste spuittechniek. Vermijd fel zonlicht tijdens de toepassing van OPTYSIL®, evenals hoge temperaturen en harde wind. De juiste dosering niet overschrijden.

Bereiding van de spuitvloeistof: Giet de helft tot tweederde van de geplande hoeveelheid water in de tank, voeg OPTYSIL® toe terwijl het roersysteem aanstaat. Voeg ook andere bladmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen volgens hun gebruiksaanwijzing toe. Vul de tank met water. Gebruik de vloeistof onmiddellijk na de bereiding.

INTERMAG **Fabrikant: INTERMAG sp. z o.o.**
AL. 1000-lecia 15G, 32-300 OLKUSZ
tel. +48 32 64 55 900, intermag@intermag.pl
www.intermag.eu
Vervaldatum/batchnummer/nettogewicht: op de verpakking

BLADTOEPASSING: Dosering OPTYSIL®: 0,5 l/ha
Tijdstip van bladtoepassing (♦ optimale termen, ◊ optionele / aanvullende termen)
De voorgestelde aanbevelingen zijn algemeen. Ze kunnen worden aangepast aan de individuele behoeften van planten en groeiomstandigheden.
Granen. 2–4 bladbespuitingen, dosering 0,5 liter/hectare: ◊ Herfsttoepassing in 3–6 bladstadium (BBCH 13–16), ♦ Voorjaarstoepassing bij uitstoeling (BBCH 22–29), ♦ Zomergraan vanaf 3 bladstadium tot uitstoeling (BBCH 13–29), Zomer/Wintergraan, ♦ Tijdens strekkingsfase (BBCH 30–51), ◊ en vanaf moment zichtbaarheid aar tot uiterlijk kort voor afrijping aar (BBCH 52–73)
Aardbei. 3–5 bladbespuitingen, dosering 0,5 liter/hectare: ◊ Eerste bladbespuiting bij 3–7 bladeren (BBCH 13–17), ♦ Vervolgens bladbespuitingen bij witte knop zichtbaar (BBCH 58–59), ◊ bij begin van bloei (BBCH 61), ♦ bij einde bloei (BBCH 67–73), ♦ en wanneer de eerste aardbeien gaan kleuren (BBCH 85)
Sluitkool. 2–4 bladbespuitingen, dosering 0,5 liter/hectare: ♦ Bladtoepassing vanaf 5–6 volgroeide bladeren (BBCH 15–16), ◊ 14 dagen later herhalen (BBCH 17–19), ◊ Vervolgens bij 20–30% van volgroeide kool (BBCH 42–43), ♦ en bij 60–80% van volgroeide kool (BBCH 46–48)
Bloemkool/Broccoli. 2–3 bladbespuitingen, dosering 0,5 liter/hectare: ♦ Bladtoepassing vanaf 5–6 volgroeide bladeren (BBCH 15–16), ♦ 14 dagen later herhalen (BBCH 23–28), ◊ Vervolgens bij het starten van de vorming van de bloemkool/broccoli (BBCH 41–42)
Wortelgewassen. 2–5 bladbespuitingen, dosering 0,5 liter/hectare: ◊ Bladtoepassing vanaf 3–4 volgroeide bladeren (BBCH 13–14), ♦ 14 dagen later herhalen (BBCH 23–28), ♦ Vervolgens vanaf het starten van de vorming van de wortel tot 20% van de gewenste diameter (BBCH 15/41–42), ◊ en herhalen bij 30–40% van de gewenste diameter (BBCH 43–44), ♦ en 70–80% van de gewenste diameter (BBCH 47–48)
Zaaiuien. 5 bladbespuitingen, dosering 0,5 liter/hectare. Start vanaf 4 pijpje en vervolgens iedere 14 dagen herhalen
Bloembolgewassen. 5 bladbespuitingen, start vanaf eerste fungicidetoepassing en vervolgens iedere 14 dagen herhalen. Niet toepassen tijdens de bloei.
Zaailing. Aantal behandelingen 1: ◊ fase 1.–3. van het blad. Dosering 0,05 liter van het preparaat in 100 liter water (bewateren of spuiten).
FERTIGATIE: Aanbevolen oplossing 50–270 ml OPTYSIL® op 1000 liter meststoffenoplossing. Toepassen in een aparte fertigatie-cyclus of samen met meststoffen. Teelt in de open lucht: om de 3–5 dagen fertigatie-cyclus. Grondloze teelt: vullen matten met water meerdere malen tijdens de vegetatiefase van planten. Bij aardbeienteelt tot 120 ml OPTYSIL op 1000 liter meststoffenoplossing.
IRRIGATIE/BEWATERING: Werkoplossing: 0,1% (100 ml OPTYSIL® in 100 l water). Gebruik 3-6 keer tijdens het groeiseizoen.
Aanbevelingen voor andere soorten zijn te verkrijgen door de QR-code te scannen of op www.intermag.eu.
Opslag en transport: Bewaar OPTYSIL® in de originele, goed gesloten en geëtiketteerde fabrieksverpakkingen in ruimtes met temperaturen tussen 0°C en +30°C. Bescherm het product tegen vocht en zonlicht. Verpakkingen goed gesloten en rechtop bewaren en transporteren. Bij het morsen verzamel de vloeistof en spoel het oppervlak af met water. De verzamelde vloeistof moet op de juiste manier worden afgevoerd. Aantal lagen tijdens opslag en transport: 3 – dozen van SL.

Voorzorgsmaatregelen: Buiten het bereik van kinderen bewaren. Draag een veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen en veiligheidskleding. Hygiënevoorschriften naleven. Niet eten - in geval van consumptie contact opnemen met een arts. In geval van oogcontact - met veel water spoelen en een arts raadplegen. In geval van contact met de huid - spoel overvloedig met water en was de kleding voor hergebruik. Bij twijfel medisch advies inwinnen. Voor details over voorzorgsmaatregelen, eerstehulpmaatregelen en andere instructies voor het behandelen van het product, zie het veiligheidsinformatieblad.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen